

التحصين المثبط الثلاثي لأمراض النيوكاسل، الالتهاب الشعبي المعدي وظاهرة انخفاض البيض
New Disease, Infection Bronchitis and Egg Drop Syndrome Vaccine, Inactivated

(La Sota strain + M41 Strain + AV127 Strain) العترات المستخدمة في التحصين:

١- تركيز عالي من الأنتيجين وكفاءة مناعية عالية

فيروس مرض النيوكاسل المثبط سلالة لاسوتا
 عيار الفيروس $\leq 10^{2.1}$ في ٠,٥ مللي قبل التثبيط
 فيروس مرض الالتهاب الشعبي المعدي المثبط سلالة M41
 عيار الفيروس $\leq 10^{2.3}$ في ٠,٥ مللي قبل التثبيط
 فيروس متلازمة هبوط البيض المثبط سلالة AV127
 عيار الفيروس $\leq HA1000$ في ٠,٥ مللي قبل التثبيط

٢- مادة حاملة ممتازة - ليس لها آثار جانبية

مادة حاملة تم استيرادها من فرنسا - ذات تأثير فعال لتحقيق استجابة مناعية سريعة - وقائية على المدى الطويل
 - سهل الحقن - لا يوجد لها آثار جانبية على صحة الدواجن .

٣- جرعة واحدة تعطي ثلاثة أنواع من الحماية

جرعة واحدة من اللقاح تعطي حماية من ثلاثة أنواع من الأمراض والحصول علي أفضل مستوى من الأجسام المناعية

* دواعي الاستعمال :



هذا اللقاح يعطي للحماية من أمراض النيوكاسل , الإلتهاب الشعبي المعدي و ظاهرة انخفاض البيض في الدواجن .

* الاستخدام والجرعات :

مكان الحقن : الحقن في العضل او تحت الجلد عند مؤخرة الرقبة .

عمر الطيور : الدواجن قبل انتاج البيض (١٦ - ٢٠) اسبوع من العمر .

الجرعه : ٠,٥ مللي لكل طائر .



إحتياطات الاستخدام :

١- يجب تحصين الطيور السليمة فقط

٢- للحصول على اعلى معدل للمنعاعات يجب استخدام اللقاح الحي لأمراض النيوكاسل والالتهاب الشعبي المعدي قبل استخدام هذا اللقاح الثلاثي كممهد تحصين اولي

٣- يتم اخراج اللقاح من الثلاجة ويترك حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة ٢٥ درجة مئوية

٤- يتم رج اللقاح جيدا قبل واثناء الاستخدام

٥- يتم استخدام زجاجة التحصين بالكامل خلال ٢٤ ساعة من فتح الزجاجاة

* العبوة : زجاجة تحتوي على (٢٥٠) مللي

* التخزين والصلاحيية : يتم التخزين على درجة حرارة ٢ - ٨ درجة مئوية صالحة لمدة ٢٤ شهرا من الانتاج .

العنوان / ١٠٦ ش الملك فيصل - الجيزة

ت / ٣٣٨٤٧١٧٢ - ٣٣٨٤٠٩٢٠ ف / ٣٣٨٤١٤٨٦ / ٠٢٣٣٨٦١٤٨٦

marketing@egavetgroup.com

www.egavetgroup.com