



لقاح مرض نيوكاسل وإلتهاب الشعب الهوائية المعدى، حى (سلاله لاسوتا + سلاله إنتش 120)

١- حماية ممتازة - فيروسات اللقاح لها مسار محدد فى الجهاز التنفسى والجهاز الهضمى وبالتالي توفر حماية أفضل.

٢- توفير مناعة مزدوجة - تحفيز المناعة الدموية والمناعة الخلوية

٣- أمانة للغاية للدواجن - فيروسات اللقاح منخفضة الضراوة ولا تسبب أى أضرار للغشاء المخاطى.

٤- عدم وجود تداخل مناعى - تركيز antigen كافى ومكافئ لـ فيروس نيوكاسل وفيروس إتهاب

الشعب الهوائية المعدى يحل مشكلة التداخل المناعى بين نيوكاسل وإلتهاب الشعب الهوائية المعدى.

١٠٦ شارع الملك فيصل - جيزة - مصر

ت: ٣٣٨٤٧١٧٢ - ٣٣٨٤٠٩٢٠ - ف: ٣٣٨٦١٤٨٦

egavet@egavetgroup.com

www.egavetgroup.com

Astra Vet

دواعى الإستخدام

تحصين الدواجن ضد فيروس نيوكاسل وفيروس إتهاب الشعب الهوائية المعدى.

الجرعة و طريقة التحصين

- تحصين العين (قطرة العين) أو الأنف (قطرة الأنف)

تخفيف 1000 جرعة إلى 40 مل، وإعطاء قطرة واحدة فى العين أو الأنف لكل طائر.

- التحصين فى مياه الشرب

الدواجن ≥ 2 أسبوع يخفف 1000 جرعة فى 10 لترات من الماء


* 2-8 أسبوع تخفف 1000 جرعة فى 20 لترًا من الماء

* ≤ 8 أسبوع تخفف 1000 جرعة فى 40 لترًا من الماء

- التحصين بالرش

تخفيف 1000 جرعة فى 150-300 مل من الماء المقطر المعقم.

الكفاءة المناعية



الإحتياطات

- 1- بمجرد تحضير اللقاح ، يجب إستخدامه على الفور. يجب التخلص من أى لقاح غير مستخدم.
- 2- تحصين الطيور السليمة فقط
- 3- إستخدام أجهزة رش أو مساقى نظيفة تماما و خالية من المطهرات
- 4- تجنب تعرض اللقاح لدرجات حرارة عالية وضوء الشمس المباشر

المواصفة

* (1) 1000 جرعة / زجاجة

* (2) 2000 جرعة / زجاجة

التعبئة

* 10 زجاجات / صندوق.

التخزين

* يخزن فى الظلام عند درجة حرارة من 2 - 8 درجة مئوية.

